

Stand: Juni 2020

Notfallplan schwere Unterzuckerung mit Glukagongabe

Für den extrem seltenen Fall einer schweren Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit finden Sie hier die wichtigsten Handlungsanweisungen. Alle Betreuer*innen eines Kindes mit Diabetes – auch alle Vertretungskräfte – müssen diese kennen.

Name, Vorname des Kindes

hat Typ 1 Diabetes und wird mit Insulin behandelt.

Foto

Telefonnummern der Erziehungsberechtigten:

Name, Vorname:

Privat:

Arbeit:

Mobil:

Privat:

Arbeit:

Mobil:

Wenn eine schwere Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit auftritt:

- 1. Ruhe bewahren**
- 2. Stabile Seitenlage (wie nach Unfall)**
- 3. Keine feste oder flüssige Nahrung einflößen (Gefahr durch verschlucken!)**
- 4. Notarzt rufen**
 - Telefon: **112**
 - Diagnose: Diabetes
 - Anlass: schwere Unterzuckerung
 - Adresse
- 5. Gabe des Notfallmedikaments Glukagon (Baqsimi® 3mg Nasenpulver)**
 - Verabreichen Sie das Glukagon-Nasenpulver in ein Nasenloch.
 - Sobald das Kind wieder wach ist, süßes Getränk, Traubenzucker oder Snack geben.
- 6. Beim Kind bleiben. Erziehungsberechtigte informieren.**

Andere Hilfsmaßnahmen, die mit den Erziehungsberechtigten besprochen wurden:

Datum/Stempel/Unterschrift behandelnde/r Arzt/Ärztin